




3TC avec repas 2 fois/ jour



3TC sans repas 2 fois/ jour



Effets secondaires



Conseil Attention !





Prend pilule 3TC

marche bien ou séparer ?

pilules naturels vitamines et santé ex: Centrum, Bio, etc.



Prend pilule 3TC

marche bien ou séparer ?

pilules malade ex: rhume, Tylenol, Advil, Halls, etc.



Si

toi ne comprend pas

SVP

RAPPEL IMPORTANT

3TC (lamivudine)
Inhibiteur Nucléosidique de la Transcriptase Inverse (INTI)
3TC dans quoi ? Combivir et Trizvir

Pilules: Adulte 50 kg et plus
1 pilule 3TC (150 mg) 2 fois par jour (environ entre 12 heures)
Combien pilules total/ jour: 2 pilules
Prend 3TC: Avec repas ou sans repas.

Si oublié prendre pilule 3TC: Si toi oublie heure pas longtemps, toi peut prendre pilule maintenant pas trop tard. Si toi oublie déjà trop tard heure long, toi ne prend pas double (2 fois) pilules. Mieux laisse faire prochaine fois prendre pilule. (1 fois)

Effets secondaires: mal tête, mal muscle, fatigue, difficile dormir, tête vide tombe, toux, vomir, mal coeur, caca mouille, problème nez. Si toi sent pas normal malade apparaît effets secondaires.
Toi doit voir ton médecin MAINTENANT VITE.



faut

voir

médecin ou pharmacie



faut

voir

médecin ou pharmacie



viens

voir

CSSQ

Conseils: Si toi sent mal coeur. Mieux avec repas et pilule 3TC.

Mélange 3TC avec autres pilules ensemble naturels, vitamine, santé, malade et anti-VIH ex. (sirop, vitamines, fer, Tylenol, Advil, Halls, rhume, etc.) ? : Mieux demande ton médecin ou pharmacie pour savoir prendre autres pilules oui ou non avec 3TC.

Boire alcool ?: NON parce qu'il peut dommage foie. Pas avec pilule.

Où et comment garder ? : Toi ne mettre pas bouteille 3TC dans bain ou toilette. Garder entre 2 et 30°C dans endroit sec et sombre. Enfants ne touchent pas.



Pour plus d'informations

Coalition Sida des Sourds du Québec

2075, rue Plessis, bureau 320
Montréal (Québec) H2L 2Y4
Courriel: intervention@cssq.org
Téléphone ATS: (514) 1-877-535-5556
Télécopieur ou FAX: (514) 521-1137
Service Relais Bell (pour la voix): 1-800-855-0511

Ce projet est financé par le Programme d'innovation communautaire VIH/sida 2004 de GlaxoSmithKline - ShireBioChem



GlaxoSmithKline in partnership with



Shire BioChem



Partenaire: **CPAVIH**

Réalisation: **Theara Yim**
Conception: **Michel Turgeon**
Illustrateurs: **Theara Yim et Sylvain Simard**
Figurants: **Theara Yim et Sylvain Simard**
Merci à tous les bénévoles !


Références bibliographiques:

- Therrien, Rachel et Prévost, Marie 2004.
Petit guide des antirétroviraux. Québec: UHRESS du CHUM
- 1998. Feuillelet d'information
Ontario : Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE)


Votre agent(e) multiplicateur(trice)/ organisme

3TC 150 mg
LAMIVUDINE


INTI (INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE)



PILULE



3TC



GX CJ7

150 mg
1 pilule/ 2 fois plus + 50 kg adulte



Coalition Sida des Sourds du Québec

