




COMBIVIR avec repas 2 fois/ jour




COMBIVIR sans repas 2 fois/ jour




Effets secondaires



Conseil Attention !



suite effets secondaires





Prend pilule COMBIVIR

marche bien ou séparer ?

pilules naturels vitamines et santé ex: Centrum, Bio, etc.



Prend pilule COMBIVIR

marche bien ou séparer ?

pilules malade ex: rhume, Tylenol, Advil, Halls, etc.



Si

toi ne comprend pas

SVP

RAPPEL IMPORTANT

COMBIVIR (zidovudine + lamivudine ou Rétrovir + 3TC)
Inhibiteur Nucléosidique de la Transcriptase Inverse (INTI)
COMBIVIR dans quoi ? ensemble AZT (retrovir) et 3TC (lamivudine)

Pilules: Adulte 50 kg et plus , 12 ans et plus
1 pilule COMBIVIR (3TC 150 mg et AZT 300 mg) 2 fois par jour
(environ entre 12 heures)

Combien pilules total/ jour: 2 pilules

Prend COMBIVIR: Avec repas ou sans repas.

Si oublié prendre pilule COMBIVIR: Si toi oublie heure pas longtemps, toi peut prendre pilule maintenant pas trop tard. Si toi oublie déjà trop tard heure long, toi ne prend pas double (2 fois) pilules. Mieux laisse faire prochaine fois prendre pilule. (1 fois)

Effets secondaires: fatigue, mal tête, problème nez, toux, mal muscle, difficile dormir, (vertige, évanouir ou tête vide tombe), mal coeur, vomir, caca mouille, pas faim, faible, peau ou ongles plus pâles, mal ventre, perdu poids, difficile respirer, pipi jaune foncé, caca pâle. Si toi sent pas normal malade apparaître effets secondaires. Toi doit voir ton médecin MAINTENANT VITE.



faut

voir

médecin ou pharmacie



faut

voir

médecin ou pharmacie



viens

voir

CSSQ

Conseils: Aucun

Mélange COMBIVIR avec autres pilules ensemble naturels, vitamine, santé, malade et anti-VIH ex. (sirop, vitamines, fer, Tylenol, Advil, Halls, rhume, etc.) ? : Mieux demande ton médecin ou pharmacie pour savoir prendre autres pilules oui ou non avec COMBIVIR.

Boire alcool ?: NON parce qu'il peut dommage foie. Pas avec pilule.

Où et comment garder ? : Toi ne mettre pas bouteille COMBIVIR dans bain ou toilette. Garder entre 15 et 30°C dans endroit sec et sombre. Enfants ne touchent pas.



Pour plus d'informations

Coalition Sida des Sourds du Québec

2075, rue Plessis, bureau 320
Montréal (Québec) H2L 2Y4
Courriel: intervention@cssq.org
Téléphone ATS: (514) 1-877-535-5556
Télécopieur ou FAX: (514) 521-1137
Service Relais Bell (pour la voix): 1-800-855-0511

Ce projet est financé par le Programme d'innovation communautaire VIH/sida 2004 de GlaxoSmithKline - ShireBioChem



GlaxoSmithKline in partnership with



Shire BioChem



Partenaire: **CPAVIH**

Réalisation: **Theara Yim**

Conception: **Michel Turgeon**

Illustrateurs: **Theara Yim et Sylvain Simard**

Figurants: **Theara Yim et Sylvain Simard**

Merci à tous les bénévoles !

Références bibliographiques:


- Therrien, Rachel et Prévost, Marie 2004.
Petit guide des antirétroviraux. Québec: UHRESS du CHUM
- 1998. Feuillelet d'information
Ontario : Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE)

Votre agent(e) multiplicateur(trice)/ organisme

COMBIVIR

AZT (RÉTROVIR) ET 3TC (LAMIVUDINE)


INTI (INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE)



PILULE



COMBIVIR



**3TC 150 mg/
AZT 300 mg**
1 pilule/ 2 fois
adulte plus + 50 kg
enfant 12 ans et plus

COMBIVIR



Coalition Sida des Sourds du Québec