



## SUSTIVA sans repas 1 fois (Mieux soir)




C'est mieux pilule Sustiva sans repas (zéro mange).  
Prend pilule Sustiva pendant soir ou avant dormir nuit  
parce que moins effets secondaires et moins problème cerveau


## SUSTIVA avec repas pas trop gras 1 fois (Mieux soir)



## Effets secondaires



## Conseil Attention !





Prend pilules SUSTIVA



marche bien ou séparer ?



pilules naturels vitamines et santé ex: Centrum, Bio, etc.



Prend pilules SUSTIVA



marche bien ou séparer ?



pilules malade ex: rhume, Tylenol, Advil, Halls, etc.



Si



toi ne comprend pas



SVP

### RAPPEL IMPORTANT

**SUSTIVA** (efavirenz ou EFV)

Inhibiteur Non-Nucléosidique de la Transcriptase Inverse (INNTI)

#### Pilules: Adulte

3 pilules SUSTIVA (200 mg) 1 fois par jour

(même jour entre 24 heures)

**Combien pilules total/ jour:** 3 pilules

**Prend SUSTIVA:** Avec repas ou sans repas.

Mais, c'est mieux sans repas parce que moins effets secondaires.

**Si oublié prendre pilule SUSTIVA:** Si toi oubli heure pas longtemps, toi peut prendre pilule maintenant pas trop tard. Si toi oubli déjà trop tard heure long, toi ne prend pas double (2 fois) pilules. Mieux laisse faire prochaine fois prendre pilule. (1 fois)

**Effets secondaires:** (vertige, évanouir ou tête vide tombe), difficile dormir, dort léger, perdu suivre, rêves bizarres, dépression, (trop nerveux, angoisse, peur), fâche, mal coeur, vomir, caca mouille, fatigue. Si toi sent pas normal malade apparaître effets secondaires. Toi doit voir ton médecin MAINTENANT VITE.



faut



voir



médecin ou pharmacie



faut



voir



médecin ou pharmacie



viens



voir



CSSQ

**Conseils: A- Mieux prend pilule SUSTIVA pendant soir ou avant dormir nuit parce que moins effets secondaires et moins problème cerveau.**

**B- Femmes enceintes (avoir bébé dans ventre) ne prend pas pilule SUSTIVA parce que pilule SUSTIVA dommage bébé mort-né.**

**C- Ne prend pas repas trop gras parce que apparaître effets secondaires.**

**Mélange SUSTIVA avec autres pilules ensemble naturels, vitamine, santé, malade et anti-VIH ex. (sirop, vitamines, fer, Tylenol, Advil, Halls, rhume, etc.) ? : Mieux demande ton médecin ou pharmacie pour savoir prendre autres pilules oui ou non avec SUSTIVA.**

**Boire alcool ? : NON** parce qu'il peut dommage foie, apparaître effets secondaires et problème cerveau. Pas avec pilule.

**Où et comment garder ? : Toi ne mettre pas bouteille SUSTIVA dans bain ou toilette. Garder entre 15 et 30°C dans endroit sec et sombre. Enfants ne touchent pas.**



Pour plus d'informations

### Coalition Sida des Sourds du Québec

2075, rue Plessis, bureau 320

Montréal (Québec) H2L 2Y4

Courriel: intervention @cssq.org

Téléphone ATS: 1-877-535-5556

Télécopieur ou FAX: (514) 521-1137

Service Relais Bell (pour la voix): 1-800-855-0511

**Ce projet est financé par le Programme d'innovation communautaire VIH/sida 2004 de GlaxoSmithKline - ShireBioChem**



GlaxoSmithKline in partnership with



Shire BioChem



Partenaire: **CPAVIH** CPAVIH

Réalisation: **Theara Yim**

Conception: **Michel Turgeon**

Illustrateurs: **Theara Yim et Sylvain Simard**

Figurants: **Theara Yim et Sylvain Simard**

Merci à tous les bénévoles !

#### Références bibliographiques:

- Therrien, Rachel et Prévost, Marie 2004.

Petit guide des antirétroviraux. Québec: UHRESS du CHUM

- 1998. Feuillelet d'information


Ontario : Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE)

Votre agent(e) multiplicateur(trice)/ organisme

# SUSTIVA 200 mg

EFVIRENZ OU EFV


INNTI (INHIBITEUR NON-NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE)



PILULE



SUSTIVA



200 mg  
3 pilule/ 1 fois  
adulte

# SUSTIVA



Coalition Sida des Sourds du Québec