


TRIZIVIR avec repas 2 fois/ jour



TRIZIVIR sans repas 2 fois/ jour



Effets secondaires

Effets (apparaître) **Conséquence (après quoi)**

fatigue céphalées (mal tête) symptômes nasaux (problème nez) toux myalgies (mal muscle) insomnie (difficile dormir) étourdissements (vertige, évanouir ou tête vide tombe) nausées (mal coeur) vomir diarrhée (caca mouille) anorexie (pas faim) anémie (fatigue, faible, peau ou ongles plus pâles)

Conseil Attention !

Conseil **Important**

si toi sentir réaction hypersensibilité (fièvre mal coeur, fatigue, vomir, mal gorge, etc) voir vite médecin parce que cause possible danger mort ne boire pas alcool pas avec pilule



Prend pilule TRIZIVIR

marche bien ou séparer ?

pilules naturels vitamines et santé ex: Centrum, Bio, etc.



Prend pilule TRIZIVIR

marche bien ou séparer ?

pilules malade ex: rhume, Tylenol, Advil, Halls, etc.



Si

toi ne comprend pas

SVP

RAPPEL IMPORTANT

TRIZIVIR (zidovudine + lamivudine + abacavir) ou (Retrovir + 3TC + Ziagen)

Inhibiteur Nucléosidique de la Transcriptase Inverse (INTI) TRIZIVIR dans quoi ? ensemble AZT (RETROVIR) 3TC (3TC) et ABC (ZIAGEN)

Pilules: Adulte 40 kg et plus

1 pilule TRIZIVIR (retrovir: 300 mg, 3TC: 150 mg et ziagen: 300 mg)

2 fois par jour (environ entre 12 heures)

Combien pilules total/ jour: 2 pilules

Prend TRIZIVIR: Avec repas ou sans repas.

Si oublié prendre pilule TRIZIVIR: Si toi oublie heure pas longtemps, toi peut prendre pilule maintenant pas trop tard. Si toi oublie déjà trop tard heure long, toi ne prend pas double (2 fois) pilules. Mieux laisse faire prochaine fois prendre pilule. (1 fois)

Effets secondaires: fatigue, mal tête, problème nez, toux, mal muscle, difficile dormir, (vertige, évanouir ou tête vide tombe), mal coeur, vomir, caca mouille, pas faim, faible, peau ou ongles plus pâles, mal ventre, perdu poids, difficile respirer.



faut

voir

médecin ou pharmacie



faut

voir

médecin ou pharmacie



viens

voir

CSSQ

Si toi sent pas normal malade apparaître effets secondaires. Toi doit voir ton médecin MAINTENANT VITE.

Conseils: A- Faut boire gros verre d'eau avec pilule TRIZIVIR pour moins risque problème tube digestif.

B- Si toi sent très mal hypersensibilité (très malade, mal coeur, vomir, caca mouille, mal ventre, très fatigue, mal muscle, mal gorge, toux, etc). Mieux voir médecin vite. C'est possible danger pour ta vie.

****Très important.****

Mélange TRIZIVIR avec autres pilules ensemble naturels, vitamine, santé, malade et anti-VIH ex. (sirop, vitamines, fer, Tylenol, Advil, Halls, rhume, etc.) ? : Mieux demande ton médecin ou pharmacie pour savoir prendre autres pilules oui ou non avec TRIZIVIR.

Boire alcool ?: NON parce qu'il peut dommage foie. Pas avec pilule.

Où et comment garder ? : Toi ne mettre pas bouteille TRIZIVIR dans bain ou toilette. Garder entre 2 et 30°C dans endroit sec et sombre. Enfants ne touchent pas.



Pour plus d'informations

Coalition Sida des Sourds du Québec

2075, rue Plessis, bureau 320

Montréal (Québec) H2L 2Y4

Courriel: intervention @cssq.org

Téléphone ATS: 1-877-535-5556

Télécopieur ou FAX: (514) 521-1137

Service Relais Bell (pour la voix): 1-800-855-0511

Ce projet est financé par le Programme d'innovation communautaire VIH/sida 2004 de GlaxoSmithKline - ShireBioChem



GlaxoSmithKline in partnership with



Shire BioChem



Partenaire: **CPAVIH**

Réalisation: **Theara Yim**

Conception: **Michel Turgeon**

Illustrateurs: **Theara Yim et Sylvain Simard**

Figurants: **Theara Yim et Sylvain Simard**

Merci à tous les bénévoles !

Références bibliographiques:

- Therrien, Rachel et Prévost, Marie 2004.

Petit guide des antirétroviraux. Québec: UHRESS du CHUM

- 1998. Feuillelet d'information


Ontario : Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE)

Votre agent(e) multiplicateur(trice)/ organisme

TRIZIVIR

AZT (RETROVIR) + 3TC (LAMIVUDINE) + ABC (ZIAGEN)

INTI (INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE)



PILULE



TRIZIVIR



**RETROVIR 300 mg/
3TC 150 mg/
ZIAGEN 300 mg**

1 pilule/ 2 fois
adulte plus + 40 kg

TRIZIVIR



Coalition Sida des Sourds du Québec