

VIREAD avec repas 1 fois/ jour

			AM avant-midi		PM après-midi		
VIREAD						1	

↑
le repas souper plus gros
que déjeuner et dîner

INFORMATION SUR PILULES: ADULTE

Combien mg pour pilules:

VIREAD: 300 mg

1 FOIS PAR JOUR (24 heures)

1 pilule VIREAD

Combien tous pilules total/ jour: 1 pilules

Prend VIREAD: Toujours avec mange repas.

IMPORTANT LIRE BIEN: Mieux prendre gros repas dans journée avec pilule VIREAD parce que moins effets secondaires.


Ex: laquelle gros repas choisir midi ou soir. Général déjeuner: petit repas. Si toi mange prend soir, faut manger plus gros repas "souper" que dîner et déjeuner.

déjeuner: (petit repas) midi: (moyen repas)


souper: (gros repas)

Depend toi choisir midi ou souper.


Possible pilule VIREAD avec pilule VIDEX ensemble.



Effets secondaires



Effets (apparaître)



Conséquence (après quoi)



fatigue



céphalées (mal tête)



nausées (mal coeur)



vomir




diarrhée (caca mouille)




flatulences (bouche ou anus déchet gaz intestin ballon) "Pet"


Conseil Attention !




Conseil




Important




mieux




repas gras




avec




prendre




pilule




pilule VIREAD




parce que cause




moins



effet secondaires



ne boire pas



alcool pas avec pilule



Prend pilules VIREAD

marche bien ou séparer ?

pilules naturels vitamines et santé ex: Centrum, Bio, etc.



Prend pilules VIREAD

marche bien ou séparer ?

pilules malade ex: rhume, Tylenol, Advil, Halls, etc.



Si

toi ne comprend pas

SVP

RAPPEL IMPORTANT

VIREAD (tenofovir ou DF ou TDF)
Inhibiteur Nucléosidique de la Transcriptase Inverse (INTI)

Pilules: Adulte
1 pilule VIREAD (300 mg) 1 fois par jour (environ entre 24 heures)
Combien pilules total/ jour: 1 pilules
Prend VIREAD: Avec repas.

Si oublié prendre pilule VIREAD: Si toi oubli heure pas longtemps, toi peut prendre pilule maintenant pas trop tard. Si toi oubli déjà trop tard heure long, toi ne prend pas double (2 fois) pilules. Mieux laisse faire prochaine fois prendre pilule. (1 fois)

Effets secondaires: fatigue, mal tête, mal coeur, vomir, caca mouille, (bouche ou anus déchet gaz intestin ballon) "Pet".
Si toi sent pas normal malade apparaître effets secondaires.
Toi doit voir ton médecin MAINTENANT VITE.



faut

voir

médecin ou pharmacie



faut

voir

médecin ou pharmacie



viens

voir

CSSQ

Conseils: Mieux prendre gros repas avec pilule VIREAD parce que moins effets secondaires.

Mélange VIREAD avec autres pilules ensemble naturels, vitamine, santé, malade et anti-VIH ex. (sirop, vitamines, fer, Tylenol, Advil, Halls, rhume, etc.) ? : Mieux demande ton médecin ou pharmacie pour savoir prendre autres pilules oui ou non avec VIREAD.

Boire alcool ? : NON parce qu'il peut dommage foie. Pas avec pilule.

Où et comment garder ? : Toi ne mettre pas bouteille VIREAD dans bain ou toilette. Garder entre 15 et 30°C dans endroit sec et sombre. Enfants ne touchent pas.



Pour plus d'informations

Coalition Sida des Sourds du Québec

2075, rue Plessis, bureau 320
Montréal (Québec) H2L 2Y4
Courriel: intervention @cssq.org
Téléphone ATS: 1-877-535-5556
Télécopieur ou FAX: (514) 521-1137
Service Relais Bell (pour la voix): 1-800-855-0511

Ce projet est financé par le Programme d'innovation communautaire VIH/sida 2004 de GlaxoSmithKline - ShireBioChem



GlaxoSmithKline in partnership with




Partenaire: **CPAVIH**
Réalisation: **Theara Yim**
Conception: **Michel Turgeon**
Illustrateurs: **Theara Yim et Sylvain Simard**
Figurants: **Theara Yim et Sylvain Simard**
Merci à tous les bénévoles !

Références bibliographiques:
- Therrien, Rachel et Prévost, Marie 2004.
Petit guide des antirétroviraux. Québec: UHRESS du CHUM
- 1998. Feuillelet d'information
Ontario : Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE)


Votre agent(e) multiplicateur(trice)/ organisme

VIREAD 300 mg
TENOFVIR OU DF OU TDF


INTI (INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE)




PILULE



VIREAD



300 mg
1 pilule/ 1 fois adulte



VIREAD