



ZERIT avec repas 2 fois/ jour



Toi choisir haut (avec repas) ou bas (sans repas) mais général avec repas moins effets gastro-intestinaux (mal coeur, vomir et caca mouillé)


Même heure et jour (pendant 12 hrs)

ZERIT sans repas 2 fois/ jour




Même heure et jour (pendant 12 hrs)

Effets secondaires



Conseil Attention !





Prend pilule ZERIT



marche bien ou séparer ?



pilules naturels vitamines et santé ex: Centrum, Bio, etc.



Prend pilule ZERIT



marche bien ou séparer ?



pilules malade ex: rhume, Tylenol, Advil, Halls, etc.



Si



toi ne comprend pas



SVP

RAPPEL IMPORTANT

ZERIT (stavudine ou d4T)
Inhibiteur Nucléosidique de la Transcriptase Inverse (INTI)

Pilules: Adulte 60 kg et plus
1 pilule ZERIT (40 mg) 2 fois par jour (environ entre 12 heures)
Combien pilules total/ jour: 2 pilules
Prend ZERIT: Avec ou sans repas.

Si oublié prendre pilule ZERIT: Si toi oubli heure pas longtemps, toi peut prendre pilule maintenant pas trop tard. Si toi oubli déjà trop tard heure long, toi ne prend pas double (2 fois) pilules. Mieux laisse faire prochaine fois prendre pilule. (1 fois)

Effets secondaires: lent circule sang sur veines ex:ligne vert-bleu sur bras paralyser, mal tête, fatigue, difficile dormir, mal muscle, mal os, très malade, mal coeur, vomir, caca mouille, sentir piqûre toujours, sentir brûle, mal ou faible mains ou pieds, mal ventre, perdu poids, difficile respire.
Si toi sent pas normal malade apparaître effets secondaires.
Toi doit voir ton médecin MAINTENANT VITE.



faut



voir



médecin ou pharmacie



faut




voir



médecin ou pharmacie



viens



voir



CSSQ

Conseils: Si toi difficile avale les pilules. Toi peut ouvrir les pilules pour sortir les poudres (petits grains) mélange avec repas.

Mélange ZERIT avec autres pilules ensemble naturels, vitamine, santé, malade et anti-VIH ex. (sirop, vitamines, fer, Tylenol, Advil, Halls, rhume, etc.) ? : Mieux demande ton médecin ou pharmacie pour savoir prendre autres pilules oui ou non avec ZERIT.

Boire alcool ? : NON parce qu'il peut dommage foie, mal ventre, mal coeur et vomir. Pas avec pilule.

Où et comment garder ? : Toi ne mettre pas bouteille ZERIT dans bain ou toilette. Garder entre 15 et 30°C dans endroit sec et sombre. Enfants ne touchent pas.



Pour plus d'informations

Coalition Sida des Sourds du Québec

2075, rue Plessis, bureau 320
Montréal (Québec) H2L 2Y4
Courriel: intervention @cssq.org
Téléphone ATS: 1-877-535-5556
Télécopieur ou FAX: (514) 521-1137
Service Relais Bell (pour la voix): 1-800-855-0511

Ce projet est financé par le Programme d'innovation communautaire VIH/sida 2004 de GlaxoSmithKline - ShireBioChem



GlaxoSmithKline in partnership with



Shire BioChem



Partenaire: **CPAVIH**

Réalisation: **Theara Yim**
Conception: **Michel Turgeon**
Illustrateurs: **Theara Yim et Sylvain Simard**
Figurants: **Theara Yim et Sylvain Simard**
Merci à tous les bénévoles !


Références bibliographiques:

- Therrien, Rachel et Prévost, Marie 2004.
Petit guide des antirétroviraux. Québec: UHRESS du CHUM
- 1998. Feuillelet d'information
Ontario : Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE)


Votre agent(e) multiplicateur(trice)/ organisme

ZERIT 40 mg
STAVUDINE OU D4T


INTI (INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE)



PILULE



ZERIT



40 mg
1 pilule/ 2 fois
adulte plus + 60 kg

ZERIT



Coalition Sida des Sourds du Québec