




## ZIAGEN avec repas 2 fois/ jour




## ZIAGEN sans repas 2 fois/ jour



## Effets secondaires




## Conseil Attention !





Prend pilule ZIAGEN  
marche bien ou séparer ?  
pilules naturels vitamines et santé  
ex: Centrum, Bio, etc.



Prend pilule ZIAGEN  
marche bien ou séparer ?  
pilules malade  
ex: rhume, Tylenol, Advil, Halls, etc.



Si  
toi ne comprend pas  
SVP

**RAPPEL IMPORTANT :**  
**ZIAGEN** (abacavir ou ABC)  
Inhibiteur Nucléosidique de la Transcriptase inverse (INTI)


**Pilules:** Adulte  
1 pilule ZIAGEN (300 mg) 2 fois par jour (environ entre 12 heures)  
**Combien pilules total/ jour:** 2 pilules  
**Prend ZIAGEN:** Avec repas ou sans repas.

**Si oublié prendre pilule ZIAGEN:** Si toi oubli heure pas longtemps, toi peut prendre pilule maintenant pas trop tard. Si toi oubli déjà trop tard heure long, toi ne prend pas double (2 fois) pilules. Mieux laisse faire prochaine fois prendre pilule. (1 fois)


**Effets secondaires:** fatigue, mal tête, difficile dormir, mal muscle, mal coeur, vomir, caca mouille, pas faim, très malade, mal ventre, mal gorge, toux. Si toi sent pas normal malade apparaît effets secondaires. Toi doit voir ton médecin MAINTENANT VITE.



faut  
voir  
médecin  
ou pharmacie



faut  
voir  
médecin  
ou pharmacie



viens  
voir  
CSSQ

**Conseils:** Si toi sent très mal hypersensibilité (très malade, mal coeur, vomir, caca mouille, mal ventre, très fatigue, mal muscle, mal gorge, toux, etc). Mieux voir médecin vite. C'est possible danger pour ta vie.  
**\*\*Très important.\*\***

**Mélange ZIAGEN avec autres pilules ensemble naturels, vitamine, santé, malade et anti-VIH ex. (sirop, vitamines, fer, Tylenol, Advil, Halls, rhume, etc.) ?** : Mieux demande ton médecin ou pharmacie pour savoir prendre autres pilules oui ou non avec ZIAGEN.

**Boire alcool ?:** NON parce qu'il peut dommage foie. Pas avec pilule.

**Où et comment garder ? :** Toi ne mettre pas bouteille ZIAGEN dans bain ou toilette. Garder entre 15 et 30°C dans endroit sec et sombre. Enfants ne touchent pas.



Pour plus d'informations

**Coalition Sida des Sourds du Québec**

2075, rue Plessis, bureau 320  
Montréal (Québec) H2L 2Y4  
Courriel: intervention @cssq.org  
Téléphone ATS: 1-877-535-5556  
Télécopieur ou FAX: (514) 521-1137  
Service Relais Bell (pour la voix): 1-800-855-0511

**Ce projet est financé par le Programme d'innovation communautaire VIH/sida 2004 de GlaxoSmithKline - ShireBioChem**



GlaxoSmithKline in partnership with



Shire BioChem



Partenaire: **CPAVIH**

Réalisation: **Theara Yim**  
Conception: **Michel Turgeon**  
Illustrateurs: **Theara Yim et Sylvain Simard**  
Figurants: **Theara Yim et Sylvain Simard**  
Merci à tous les bénévoles !

**Références bibliographiques:**


- Therrien, Rachel et Prévost, Marie 2004.  
Petit guide des antirétroviraux. Québec: UHRESS du CHUM  
- 1998. Feuillelet d'information  
Ontario : Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE)

**Votre agent(e) multiplicateur(trice)/ organisme**


# ZIAGEN 300 mg

ABACAVIR


**INTI (INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE)**



PILULE



ZIAGEN



300 mg  
1 pilule/ 2 fois  
adulte

**ZIAGEN**



Coalition  
Sida des  
Sourds du  
Québec